


Signos Visibles (podrían no estar presentes)



Signos y Síntomas Adicionales

Una versión más grande del gráfico anterior que contiene signos y síntomas detallados está disponible para descarga en strangulationtraininginstitute.com/resources/library/pediatric/

Este proyecto es apoyado total o parcialmente por la beca 2016-TA-AX-K067 otorgada por la Oficina de Violencia Contra la Mujer, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresados en esta publicación/programa/exposición son las del autor(es) y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Departamento de Justicia, Oficina de Violencia Contra la Mujer.



Un programa de

ALLIANCE for
HOPE
INTERNATIONAL

Ilustraciones y Diseño Gráfico por Yesenia Aceves

ESTRANGULACIÓN

El estrangulamiento es a menudo, poco reconocido en los niños, pero no es menos serio que el de los adultos. El estado de inconsciencia puede ocurrir en cuestión de segundos y la muerte en cuestión de minutos. Los niños pueden ser estrangulados cuando los proveedores de cuidado pierden el control, como parte de un asalto físico y/o sexual, o como forma extrema de demostrar poder y control sobre el niño. El estrangulamiento de un niño puede tener efectos físicos y mentales duraderos y puede resultar en la muerte aun meses después.

Los niños, víctimas del estrangulamiento, pueden sentir terror o dolor extremo. Si el estrangulamiento continúa, la pérdida del conocimiento seguirá. Antes de caer en estado inconsciente, el niño víctima por lo general se resistirá de forma violenta, lo que a menudo producirá lesiones en su propio cuello o a la cara o manos del agresor. Estas lesiones defensivas pueden no estar presentes en niños pequeños o con discapacidades del desarrollo, o si la víctima es restringida físicamente o químicamente.


Observando Cambios

Es muy útil elaborar un diario de evidencia física por medio de documentación de fotografías en secuencia por un período de días después de la agresión. Las víctimas también deben buscar atención médica si tienen dificultad al respirar, hablar, tragar o si sufren náusea, vómito, mareo, dolor de cabeza y/o defecan u orinan involuntariamente en niños que no usan pañales. Una evaluación médica puede ser crucial en la detección de lesiones internas y salvar la vida.

Pérdida de Conciencia

Las víctimas pueden perder la conciencia por uno o todos los siguientes métodos: bloqueo de las arterias carótidas en el cuello (privar al cerebro de oxígeno), el bloqueo de las venas yugulares (evitando que la sangre desoxigenada salga del cerebro), y el cierre de la vía respiratoria, lo que hace imposible la respiración.

ESTRANGULACIÓN INFORMACIÓN FUNDAMENTAL para padres y tutores



Monitoree los Signos

Anote los signos del niño, incluya la fecha y hora

Monitoree los Síntomas

Anote los síntomas del niño, incluya la fecha y hora

Anote cualquier otra sensación

Signos de Estrangulamiento

CABEZA—falta de cabello, golpes, fractura de cráneo, conmoción cerebral, puntos rojos (petequias).

CARA—marcas enrojecidas, petequias, arañazos.

OJOS Y PÁRPADOS—petequias en uno o ambos globos oculares, ojos rojos y/o ensangrentados.

OÍDO—petequias (externas en la oreja y/o en el conducto auditivo), sangrado del conducto auditivo externo.

NARIZ—sangre en la nariz, nariz rota, petequias.

BOCA—moretones, inflamación de la lengua, labios hinchados, cortadas/abrasiones (raspaduras).

BAJO LA BARBILLA—enrojecimiento, arañazos, moretones, abrasiones.

CUELLO—enrojecimiento, marcas de arañazos, impresiones de uñas, moretones, abrasiones, hinchazón, marcas de ligaduras o ropa.

PECHO Y HOMBROS—enrojecimiento, marcas de arañazos, moretones, abrasiones.

Síntomas de Estrangulamiento

CAMBIOS EN LA VOZ—voz rasposa y/o ronca, tos, incapacidad de hablar, pérdida completa de voz.

CAMBIOS DE INGESTIÓN—dificultad para tragar, dolor al tragar, dolor de cuello, náuseas/vómitos, babeo.

CAMBIOS RESPIRATORIOS—dificultad para respirar, hiperventilación, incapaz de respirar.

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO—inquietud o combatividad, problemas de concentración, amnesia (pérdida de memoria), agitación, alucinaciones, síndrome de estrés postraumático.

CAMBIOS VISUALES—pérdida completa, o visión en blanco y negro, viendo 'estrellas', borrosidad, oscuridad, difusa alrededor de los ojos.


CAMBIOS AUDITIVOS—pérdida total de audición, pitidos, gorgoteo, zumbidos, presión, sonido como por un túnel.

OTROS CAMBIOS—pérdida de memoria, pérdida del conocimiento, mareos, dolores de cabeza, orina o defecación involuntaria o la defecación en un niño que ya no usa pañales, pérdida de fuerza, cuerpo flojo.


Diagramas para Marcar LESIONES VISIBLES

Utilice un lápiz o un marcador para indicar signos y/o síntomas visibles.


Enfrente




Bajo la Barbilla




Lado Derecho



Lado Izquierdo



Atrás



Dentro de la Boca

